

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝKONEM: GASTROSKOPIE

(endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu)

Vážená paní, vážený pane,

k výkonu, který Vám má být proveden, je potřeba Váš informovaný písemný souhlas. Proto si prosím přečtete pečlivě informaci o způsobu, významu a případných komplikacích plánovaného výkonu.

Gastroskopie je vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku, jehož cílem je zjistit příčiny potíží pacienta, případně vyloučit některá onemocnění. Čím dříve zjistíme druh a rozsah případného onemocnění, tím jsou lepší vyhlídky na léčbu.

V současné době neexistuje alternativní výkon, který by umožňoval zevrubné vyšetření slizničních povrchů, odebrání vzorků podezřelých tkání a případně léčebný zásah v jedné době.

Průběh výkonu:

Před vyšetřením ulehnete na lůžko na levý bok. Pokud máte, vyjmete si zubní protézu.

Znecitlivíme Vám sliznici hltanu lokálním anestetikem ve spreji. Mezi rty a zuby Vám vložíme náustek pro zavedení ohebného optického přístroje (gastroskopu). Sliny vytékají levým koutkem do buničiny pod levou tvář. Gastroskop zavedeme postupně do jícnu, žaludku a dvanácterníku. Během vyšetření můžete cítit přechodný tlak v krku nebo v břiše. Při vyšetření je možno odebrat vzorky sliznice (biopsie), odstraňovat nežádoucí drobné útvary (polypy), ošetřit krvácející cévu, vřed nebo odstranit spolknutý předmět. Všechny tyto výkony jsou nebolestivé. Vyšetření trvá 3 - 10 min, záleží, zda je prováděn i léčebný zákrok či biopsie. Kromě stanovení diagnózy může gastroskopie a při ní provedený léčebný zákrok nahradit šetrným způsobem chirurgický výkon (operaci). Lékař Vám rád podá informaci o endoskopických zákrocích na horní části trávicího traktu, které svým přínosem mnohonásobně převyšují možná rizika této metody.

Po předchozí domluvě Vám můžeme v případě zájmu před vyšetřením aplikovat uklidňující injekci (sedaci) do žíly.

Jako každý lékařský výkon má i gastroskopie svá **rizika a možné komplikace**:

Alergická reakce na podané léky – tuto reakci lze těžko předvídat, pokud u Vás alergie není známá.

Krvácení po léčebném zásahu - je vzácné, častější může být u pacientů s poruchou krevní srážlivosti.

Proděravění stěny trávicího traktu (perforace) – mimořádně vzácná komplikace, může nastat při biopsiích nebo při odstraňování velkých polypů. Tato komplikace většinou vyžaduje chirurgický zásah (operaci) k záchraně zdraví a naprosto vzácně i života nemocného.

Po výkonu:

Lokální anestetikum ovlivňuje polykání, najíst a napít se tedy můžete až po odeznění účinku anestetika (přibližně po 30 minutách).

Pokud jste dostal/a uklidňující injekci, mohou být omezeny Vaše reakce, během 24 hodin po výkonu tedy nesmíte řídit dopravní prostředek ani se věnovat činnostem, které vyžadují zvýšenou pozornost. Zajistěte si prosím doprovod.

Ke snížení rizika případných komplikací na minimum prosíme o **zodpovězení následujících otázek** (zakroužkujte správnou odpověď):

- | | | |
|--|------------|-----------|
| ● Krvácíte dlouho při malém poranění, po odběru krve, vytržení zubu? | Ano | Ne |
| ● Vznikají Vám snadno na kůži krevní podlitiny? | Ano | Ne |
| ● Trpíte alergií na potraviny, léky náplasti? | Ano | Ne |
| ● Užíváte pravidelně léky proti bolestem jako je např. Ibuprofen, Diclofenac či jiné? | Ano | Ne |
| ● Užíváte léky na snížení krevní srážlivosti (Anopyrin, Godasal, Warfarin, Heparin, Plavix, Clopidogrel, Trombex, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Stacyl či jiné) | Ano | Ne |
| ● Jste těhotná? | Ano | Ne |

